La fisica sperimentale nella spazio Le astroparticelle

Matteo Duranti e Filippo Ambroglini

Università degli Studi di Perugia,
Dipartimento di Fisica e Geologia
INFN Sez. Perugia

**DIPARTIMENTO DI
FISICA E GEOLOGIA**

Università degli Studi di
Perugia, Italia

1. Cenni di Fisica dei Raggi Cosmici (CRs) carichi e fotoni di alta energia (γ)
2. Rivelazione dei CRs
3. Gli esperimenti a Perugia: Fermi, AMS e DAMPE

Energia delle particelle – unità di misura: **eV**

KeV = 10^3 eV ; **MeV** = 10^6 eV ; **GeV** = 10^9 eV

Impulso p : si misura in eV/c (e suoi multipli)
 massa a riposo m_0 : si misura in eV/c²

(energia acquisita da un elettrone su 1 Volt)

MA SPESSO : $\hbar = c = 1$

Unita' di massa (m) e di impulso (p) = eV

$$E^2 - p^2 = m^2$$

massa a riposo protone ~ 1 GeV , massa elettrone = 511 KeV

$$\beta = v/c \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{E}{m}$$

I Raggi Cosmici (Cosmic Rays)

particelle stabili

Radiazione elettromagnetica:

Radio
IR
Visibile
UV
X
 γ

Astronomia
Astrofisica

Particelle cariche:

p
e⁻
e⁺
 $\bar{p}$
Nuclei
Antinuclei?
???

RC

Particelle neutre:

ν
???

Una delle armi di Goldrake
chiamati anche “disintegratori paralleli”

La Terra è “bombardata”
costantemente da un
flusso di particelle
(1 al s per cm²)

La maggior parte è di
bassissima energia e non
supera il campo
magnetico terrestre e/o
l’atmosfera

A terra arriva un flusso
(principalmente muoni) di
1 al min per cm²

La Terra è “bombardata”
costantemente da un
flusso di particelle
(1 al s per cm^2)

La maggior parte è di
bassissima energia e non
supera il campo
magnetico terrestre e/o
l’atmosfera

A terra arriva un flusso
(principalmente muoni) di
1 al min per cm^2

Particle	Year	Discoverer (Nobel Prize)	Method
e^-	1897	Thomson (1906)	Discharges in gases
p	1919	Rutherford	Natural radioactivity
n	1932	Chadwick (1935)	Natural radioactivity
e^+	1933	Anderson (1936)	Cosmic Rays
$\mu^\pm$	1937	Neddermeyer, Anderson	Cosmic Rays
$\pi^\pm$	1947	Powell (1950) , Occhialini	Cosmic Rays
$K^\pm$	1949	Powell (1950)	Cosmic Rays
π^0	1949	Bjorklund	Accelerator
K^0	1951	Armenteros	Cosmic Rays
Λ^0	1951	Armenteros	Cosmic Rays
Δ	1932	Anderson	Cosmic Rays
Ξ^-	1932	Armenteros	Cosmic Rays
$\Sigma^\pm$	1953	Bonetti	Cosmic Rays
p^-	1955	Chamberlain, Segre' (1959)	Accelerators
anything else	1955 $\implies$ today	various groups	Accelerators
$m_\nu \neq 0$	2000	KAMIOKANDE	Cosmic rays

1. Energie in gioco maggiori che in acceleratori
2. Collegamenti interdisciplinari
 - Fisica Nucleare
 - Fisica delle particelle
 - Astrofisica
3. Nuovi mezzi tecnici
 - Grandi rivelatori
 - **Palloni stratosferici**
 - **Satelliti**

- **Protoni ~87%**
- **He ~12 %**
- **1% nuclei pesanti (principalmente C)**
- **< 1% elettroni**
- **< 1% raggi γ (fotoni di alta energia), neutrini**
- **anti-p e e+**

Sono una delle principali componenti della Galassia e ~ l'unico campione di materiale di origine Galattica/extragalattica che giunge sulla Terra.

Ci portano informazioni di: **astrofisica, cosmologia, interazioni adroniche, interazioni fondamentali, dark matter, simmetria materia/antimateria, nuove particelle/interazioni, ...**

I Raggi Cosmici carichi

Misurando la conduttività
dell'atmosfera in funzione
dell'altitudine **Hess**
scopri' **I raggi Cosmici**

Contemporaneamente
anche studi paralleli
dell'italiano Pacini

**Hess nel suo
pallone con il suo
elettroscopio**

- Spettro di potenza fino a $\sim 10^{20}$ eV.
- Densità di energia ≈ 1 eV / cm^3 .
- Luminosità $L > 10^{40}$ erg/s.
- Origine della radiazione alle altissime energie ancora in discussione
- Origine dell'andamento in funzione dell'energia (“ginocchio” e “caviglia”) ancora in discussione

Chiara evidenza che nell' Universo sono all' opera acceleratori di altissima energia

Fotoni (e neutrini) di alta energia

- prodotti nelle interazioni adroniche di R.C.
- puntano alla sorgente

- Spettro di potenza fino a $\sim 10^{20}$ eV.
- Densità di energia ≈ 1 eV / cm³.
- Luminosità $L > 10^{40}$ erg/s.
- Origine della radiazione alle altissime energie ancora in discussione
- Origine dell'andamento in funzione dell'energia ("ginocchio" e "caviglia") ancora in discussione
- Composizione chimica, in funzione dell'energia, ancora largamente ignota

Chiara evidenza che nell' Universo sono all' opera acceleratori di altissima energia

Fotoni (e neutrini) di alta energia

- prodotti nelle interazioni adroniche di R.C.
- puntano alla sorgente

La maggior parte dei CR non raggiunge terra per via dell'interazione con l'atmosfera

Andiamo sopra l'atmosfera (almeno sopra la troposfera, nella stratosfera, raggiungibile anche via pallone)

Fisica delle Particelle nello spazio

Astronomia

γ

Sorgenti esotiche (raggi cosmici carichi e γ)

La velocità di rotazione degli “oggetti” nelle galassie è in contraddizione con quella prevista assumendo come massa della galassia solo quella visibile

Ricerca di DM indiretta → ricerca dei (rari nei CR) prodotti della loro annichilazione

Va conosciuto bene, però, cosa ci si aspetta dal solo ISM

What is needed?

Esperimenti

Rivelazione dallo spazio

- ❑ **Prima generazione 1960 – 1972**
 - Spark Chamber
 - Palloni Aerostatici
- ❑ **Seconda Generazione 1972-1991**
 - Spark Chambers
 - Piccoli satelliti
 - SAS-II, COS-B
- ❑ **Terza Generazione 1991-2007**
 - Spark Chamber
 - Grandi dimensioni
 - EGRET (CGRO)
- ❑ **Quarta Generazione 2007-2012+**
 - Nova tecnologia: Stato solido
 - AGILE (2007 ->)
 - FERMI (2008 ->)

Rivelazione da terra

- ❑ **Prima Generazione 1960 – 1985**
 - Discriminazione fondo debole o assente
 - Lebedev, Glencullen, Whipple, Narrabri, Crimea
- ❑ **Seconda Generazione 1985 – 2004**
 - Imaging Atmospheric Cherenkov Telescopes
 - Whipple, Crimea, CAT, HEGRA, Durham, CANGAROO
-
- ❑ **Terza Generazione 2004 –**
 - IACT di grandi dimensioni e stereoscopici
 - MAGIC-2, HESS-5, CANGAROO-III, VERITAS-4

OSO-3
(621 γ -rays)

SAS-2
(~8k γ -rays)

COS-B
(~200k γ -rays)

Fermi-LAT (Glast)

- ❑ **Misure:**
 - Direzione
 - Energia
 - Tempo
- ❑ **Schermo anti-coincidenza**
 - Identifica particelle cariche (da non considerare)
- ❑ **Convertitore**
 - Permette la conversione dei fotoni in una coppia e^+ e e^-
- ❑ **Tracciatore**
 - Misura la traiettoria di elettrone e positrone da cui si ricava la direzione del gamma
- ❑ **Calorimetro**
 - Misura l'energia depositata dallo sciame elettromagnetico
- ❑ **Count rate (GBM)**

NASA's Fermi telescope reveals best-ever view of the gamma-ray sky

Credit: NASA/DOE/Fermi LAT Collaboration

CREAM

Cosmic Ray Energetics and Mass (CREAM)

- ❑ 966 kg (2126 lbs)
- ❑ Voli: 2004 and 2005 (70 giorni) and 2007 (29 giorni), ...
- ❑ Possibile “upgrade” con installazione sulla ISS (Stazione Spaziale Internazionale)

Advanced Thin Ionization Calorimeter (ATIC)

- ❑ 1636 kg (3600 lbs)
- ❑ Voli: 2000, 2002 (30 giorni), ultimo nel 2007 (14.5 giorni)

ATIC

Transition Radiation Array for Cosmic Energetic Radiation (TRACER)

- 1614 kg (3550 lbs)
- Voli: 2003, 2006 (14 giorni)

Trans-Iron Galactic Element Recorder (TIGER)

- 700 kg (1543 lbs)
- Voli nel 2001 e 2003 (50 giorni)
- Super-TIGER in funzione dal 2013

**Payload for Antimatter Matter
Exploration and Light-nuclei
Astrophysics
(PAMELA)**

- 470 Kg
- In orbita dal 15 Giugno 2006

PAMELA

Perugia

Milano $\mathcal{L}NI$
Bologna, $CNAF$
Pisa
Perugia
Terni
Roma

60 Scientists and Engineers
6 Universities
5 INFN Sections
2 INFN National Laboratories + computing
16 years of collaboration among INFN and ASI

$\mathcal{L}NS$

Il rivelatore AMS-02

Z , P sono misurate indipendentemente da Tracker, RICH, TOF e ECAL

Il rivelatore assemblato

5m x 4m x 3m
7.5 tons

~2KW
10Mbps

19

- Fisica fondamentale e antimateria:
 - Origine primordiale (segnale: anti-nuclei)
 - Sorgenti “esotiche” (segnale: positroni, anti-p, anti-D, γ)
- Composizione e origine dei CRs
 - Sorgenti e Accelerazione: Protoi e He
 - Propagazione nel ISM: secondari (B/C, ...)

Origine primordiale (Segnale: anti-nuclei)

Dirac's Nobel speech

*“We must regard it rather as **an accident** that the Earth [...] contains a preponderance of negative electrons and positive protons. It is quite possible that for some stars it is the other way about.”*

© Michele Famiglietti / AMS Collaboration

Houston, JSC - May 16, 2011 @ 07:56 AM

Il lancio di AMS - @ KSC, Florida

Una bella esperienza...

Il gruppo del Tracker aspetta l'istallazione

Il gruppo del Tracker aspetta il lancio

AMS-Italy con il "nostro" shuttle

Dopo 3 turni di notte aspettando l'istallazione

GMT 14h 00' 51" 564
MET 00h 07' 55" 294
CRITE 00h 09' 28" 11-
STS Crew Make 04:34:32

MET 00h 07' 55" 294
100 00h 07' 55" 294
100 22h 58' 58" 43-
STS E041 A05 00:00:00-
STS E041 L05 00:00:00-55-

In orbita a @ 400 km

LAT = -37.6 INC = 51.6
 ALT = 230.0 D/N: 0:45:57
 LON = -52.5 BETA = 67.3

AMS

Astronaut at ISS AMS Laptop

TDRS Satellites

Operazioni in Orbita

Ku-Band
High Rate (down):
Eventi <10Mbit/s>
≈ 30 miliardi di trigger
70 TB di dati raw

Operazioni a Terra

S-Band
Low Rate (up & down):
Commanding: 1 Kbit/s
Monitoring: 30 Kbit/s

**AMS Payload Operations Control e
Science Operations Centers
(POCC, SOC) al CERN**

**AMS Computers
at MSFC, AL**

**White Sands Ground
Terminal, NM**

Dalla copertina di Topolino ...

**Topolino libretto n.2859
14 Settembre 2010**

$e^+ / (e^+ + e^-)$

Energy (GeV)

AMS prenderà dati per tutta la durata della Stazione Spaziale Internazionale (2024)

DAMPE, DArk Matter Particle Explorer

- Rivelazione di particelle di alta energia nello spazio
 - Ricerca indiretta di Dark Matter
 - Studio dello spettro e della composizione dei CRs
 - Astronomia di fotoni di alta energia
- Successore naturale di Fermi/LAT e AMS-02
 - Estensione dell'intervallo di energia e migliore risoluzione energetica
 - Presa dati contemporanea per un periodo

- Scintillatori, Silicon tracker, calorimetro di BGO, neutron detector
- Combina un telescopio γ -ray con un calorimetro a imaging profondo
 - Silicon tracker/converter + calorimetro di BGO a imaging
 - Totale $\sim 33 X_0 \rightarrow$ il piú “profondo” rivelatore nello spazio

State connessi!